

## 10 ANNEXE III - Prétest

### 1. Qu'est-ce que l'anaphylaxie ?

- a) Une réaction allergique locale ;
- b) Une réaction allergique généralisée ;
- c) Une réaction allergique démesurée ;
- d) Ce n'est pas une réaction allergique.

### 2. Quels sont les substances qui causent le plus souvent une anaphylaxie ?

- a) Les pollens, le gazon et les abeilles ;
- b) Les animaux, les acariens et les médicaments ;
- c) Les animaux, les pollens et le gazon ;
- d) Les abeilles, les médicaments et certains aliments.

### 3. Les signes et symptômes suivants font partie d'une réaction anaphylactique sauf un :

- a) La difficulté respiratoire ;
- b) L'état de choc ;
- c) L'enflure de la langue ;
- d) La rougeur des yeux.

### 4. Quel est le médicament qui doit être utilisé en première instance lors d'une réaction anaphylactique ?

- a) L'épinéphrine ;
- b) Le benadryl ;
- c) La cortisone ;
- d) La cimetidine.

### 5. Quelle est la dose d'épinéphrine qui doit être administrée à un enfant pesant 20 kg ?

- a) 0,15 mg;
- b) 0,30 mg;
- c) 0,3 mg;
- d) 0,015 mg.

**6. Quelle est la dose d'épinéphrine qui doit être administrée à un enfant pesant 30 kg ?**

- a) 0,15 mg;
- b) 0,3 mg;
- c) 0,03 mg;
- d) 0,015 mg.

**7. Quand doit-on administrer une nouvelle dose d'épinéphrine**

- a) Toutes les 5 minutes si détérioration;
- b) Toutes les 15 minutes si aucune amélioration;
- c) Jamais, on ne peut pas répéter la dose ;
- d) Lors de la directive du 9-1-1.

**8. Quand doit-on administrer l'épinéphrine chez une victime d'une réaction allergique grave?**

- a) Quand il devient inconscient;
- b) Quand il a de la difficulté à respirer;
- c) Aux premiers signes d'une réaction allergique;
- d) Lorsqu'il présente une détresse respiratoire, après avoir été récemment exposé à un allergène. (moins de quatre heures)

**9. En cas d'une réaction anaphylactique et lorsque le secouriste est seul, quand doit-il faire appel aux services d'urgence ?**

- a) Lorsqu'il constate que le patient est inconscient;
- b) Lorsqu'un deuxième secouriste arrive;
- c) Après avoir administré l'épinéphrine;
- d) Lorsqu'il constate qu'il s'agit d'une réaction anaphylactique.

**10. Quel est le risque immédiat de l'utilisation de l'auto-injecteur ?**

- a) Infection au site de l'injection;
- b) Injection accidentelle de l'épinéphrine dans un doigt;
- c) Piqûre accidentelle du secouriste avec l'aiguille contaminée;
- d) Saignement important au site de l'injection.